

Producto	:	PLATTFORM [®] 550 EC
Ingrediente Activo	:	Spiroxamine
Concentración	:	550 g/L
Formulación	:	Concentrado Emulsionable
Clase de Uso	:	Fungicida Agrícola
Grupo Químico	:	Spiroketalamines
Registro	:	PQUA N° 1309 -SENASA
Titular y Distribuidor	:	NEOAGRUM S.A.C.

TOXICOLOGÍA DEL PRODUCTO

PLATTFORM[®] 550 EC es un fungicida agrícola categorizado como **MODERADAMENTE PELIGROSO**.

MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN

PLATTFORM[®] 550 EC es un fungicida de acción protectora, curativa y erradicante. Inhibe la síntesis de esteroides fúngicos. Después de la aplicación, rápidamente penetra en el tejido de la hoja, los tubos germinativos se inhiben impidiendo la formación de apresorios y haustorios.

PLATTFORM[®] 550 EC puede ser usado en programas de aplicación anti oídio ya que su mecanismo de acción ataca tres puntos diferentes de la ruta metabólica de la biosíntesis del ergosterol, lo que permite hacer rotaciones adecuadas sin crear resistencia del hongo a los fungicidas usados.

CONSIDERACIONES PARA LA APLICACIÓN

- PLATTFORM[®] 550 EC se prepara la mezcla diluyendo la dosis en la mitad de agua del volumen total a utilizar, se agita bien y se completa con agua hasta llenar el cilindro.
- Realizar la aplicación de PLATTFORM[®] 550 EC preventivamente durante el periodo vegetativo dependiendo de la zona, condiciones climáticas y susceptibilidad de las variedades a la enfermedad.
- Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde.
- Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto.
- Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados.
- Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia de la plaga objetivo.

COMPATIBILIDAD

PLATTFORM[®] 550 EC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con aguas carbonatadas y productos fuertemente oxidantes o alcalinos. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

PLATTFORM[®] 550 EC no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

	FICHA TÉCNICA		Revisión: 03 Aprobado: JR Fecha: 19-07-16 Página 2 de 2
			

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/200 L	ml/ha		
ALCACHOFA	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	-	500	3	0.05
ESPÁRRAGO	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	150 - 180	-	21	0.05
PIMIENTO	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	-	500 - 600	3	0.05
VID	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	120	-	35	0.05

PC: Periodo de Carencia (días).

LMR: Límite máximo de residuo (ppm: partes por millón).

REGISTROS Y TOLERANCIAS DE RESIDUOS

Para informarse sobre los límites máximos de residuos (LMR) o tolerancias establecidas en los principales cultivos, visite los siguientes links.

EU Pesticide Database: (Comunidad Europea)

<http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN>

Environmental Protection Agency: (Estados Unidos)

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?c=ecfr&sid=1c8cd959ef0d373fb7620f42c8445cca&tpl=/ecfrbrowse/Title40/40cfr180_main_02.tpl

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 328-7700

ESSALUD: 411-8000 (opción 4)

CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



PRESENTACIONES COMERCIALES

PLATTFORM® 550 EC cuenta con registro para las siguientes presentaciones: 250 ml, 500 ml, 1 L, 4 L, 10 L, 20 L y 200 L.