

Producto	:	GO CROP®
Composición	:	Extracto de cultivos microbianos..... 1.1 % p/v Mixtura de enzimas y aminoácidos 1.0 % p/v Estimulante de crecimiento 0.1 % p/v (actividad de citoquininas) Agua 98.9 % p/v
Formulación	:	Concentrado Soluble
Clase de uso	:	Bioestimulante
Distribuidor	:	NEOAGRUM SAC

CARACTERÍSTICAS

GO CROP® es un bioestimulante natural proveniente del **EXTRACTO DE CULTIVOS MICROBIANOS**, las cuales contienen una mixtura de enzimas, aminoácidos, oligopéptidos, betaínas, giberelinas y citoquininas. Esta gama de moléculas ayuda a estimular a las plantas para que utilicen eficientemente sus reservas naturales y crezcan al máximo de su potencial de una forma natural y equilibrada. Precisamente, las citoquininas reforzarán la división y crecimiento celular de las plantas; las betaínas protegerán contra el estrés osmótico, sequía, alta salinidad y temperatura; y los oligopéptidos (cadenas cortas de aminoácidos), mejorarán la absorción de nutrientes a través de las membranas celulares. Es importante recalcar que, aunque las plantas producen su propia citoquinina, éstas se encontrarán restringidos bajo condiciones de estrés.

GO CROP® mejora la absorción eficiente de los nutrientes tanto por la vía radicular como foliar, estimulando la fotosíntesis de la planta, incrementando la proliferación de raicillas absorbentes y distribuyendo uniformemente los fotosintatos para todas las frutas. Como resultado, se logran un incremento significativo de los rendimientos y una mejor calidad de las cosechas (tanto en tamaño, uniformidad y resistencia postcosecha).

COMPATIBILIDAD

GO CROP® es compatible con la mayoría de las plaguicidas y fertilizantes foliares, excepto con fertilizantes con pH muy ácido o alcalino y aguas carbonatadas. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

EFFECTO SOBRE LOS CULTIVOS

GO CROP® no es fitotóxico para los cultivos si se siguen las recomendaciones dadas en el cuadro de usos.

RECOMENDACIONES DE USOS

CULTIVO	DOSIS		MOMENTOS DE APLICACIÓN
	(L/ha)	(L/200L)	
AJÍ, TOMATE Y OTRAS SOLANÁCEAS	0.5 - 1.0	0.25 - 0.5	1. ^a 7-10 días del trasplante. 2. ^a Al inicio de la floración. 3. ^a 4 días después de cada cosecha.
ALCACHOFA	0.5 - 1.0	0.25 - 0.5	1. ^a 15 días después del trasplante. 2. ^a Antes de la emisión de los capítulos florales. 3. ^a Al desarrollo de los capítulos florales.
ARÁNDANO	1.0 - 2.0	0.25 - 0.5	1. ^a Al inicio del brotamiento vegetativa (0-20 cm) 2. ^a En prefloración. 3. ^a En cuajado de frutos. 4. ^a En crecimiento de frutos.
ARROZ	0.5 - 1.0	0.25 - 0.5	1. ^a 7-15 días del trasplante. 2. ^a En punto de algodón. 3. ^a 7-10 días después de la última aplicación.
BRÓCOLI, COLIFLOR Y COL	0.5 - 1.0	0.25 - 0.5	1. ^a 7-10 días después del trasplante. 2. ^a En formación de cabeza.
CEBOLLA Y AJO	0.5 - 1.0	0.25 - 0.5	1. ^a Inicio de engrosamiento del bulbo. 2. ^a Repetir cada 10 días (2 veces).
ESPÁRRAGO	1.0	0.25 - 0.5	1. ^a Al primer brote de filocladios abiertos. 2. ^a Al inicio del crecimiento del segundo brote.
FRESA	1.0	0.25 - 0.5	1. ^a 15 días después del trasplante. 2. ^a Al iniciar la primera floración. 3. ^a 3 días después de cada cosecha.
FRIJOL, ARVEJA Y HOLANTAO	0.5 - 1.0	0.25 - 0.5	1. ^a A los 15-20 días de la emergencia. 2. ^a Al inicio del botoneo. 3. ^a 15 días después de la segunda aplicación.
FRUTALES CADUCIFOLIOS: MANZANO, MELOCOTÓN Y GRANADO	1.0 - 2.0	0.25 - 0.5	1. ^a En brotamiento. 2. ^a En floración. 3. ^a En crecimiento del fruto.
FRUTALES SIEMPREVERDES: MANGO, PALTO, OLIVO, CÍTRICOS, MARACUYÁ, GRANADILLA	1.0 - 2.0	0.25 - 0.5	1. ^a En brotación vegetativa. 2. ^a En floración. 3. ^a En crecimiento del fruto.
MAÍZ, TRIGO Y CEBADA	0.5 - 1.0	0.25 - 0.5	1. ^a 20-30 días después de la siembra. 2. ^a Antes de realizar el aporque. 3. A los 15 días después de la última aplicación.

PAPA, OTRAS RAÍCES Y TUBEROSAS	0.5 - 1.0	0.25 - 0.5	1. ^a 20 días después de la siembra. 2. ^a Al inicio de la tuberización. 3. ^a 15 días después de la aplicación anterior.
PEPINO, SANDÍA Y MELÓN	0.5 - 1.0	0.25 - 0.5	1. ^a 15-20 días después de la emergencia. 2. ^a En botoneo floral. 3. ^a 15 días después de la aplicación anterior.
VID	1.0 - 2.0	0.25 - 0.5	1. ^a A los 30 cm del inicio del brote. 2. ^a En floración. 3. ^a En crecimiento de la baya con 12 mm de diámetro

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

